

Sífilis

1. ¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por bacterias (gérmenes) que se puede curar con medicamentos. Si no se trata, puede causar problemas de salud graves.

2. ¿Cómo se propaga la sífilis?

Puede contraer sífilis al tener contacto con una llaga de sífilis (chancro) durante el sexo vaginal, anal u oral. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el recto (glúteos) o en los labios y la boca. A veces es posible que ni siquiera vea o sienta las llagas, ya que son indoloras. Para las personas que están embarazadas o pueden quedar embarazadas, es posible transmitir la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. Cuando un bebé nace con sífilis se llama sífilis congénita*.

3. ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

A menudo, las personas no notan síntomas, por lo que es posible que no sepan que están infectadas. Los signos de la sífilis pueden incluir una llaga cerca del área por donde las bacterias ingresaron al cuerpo o una erupción en una o más áreas del cuerpo. Los síntomas pueden desaparecer y reaparecer. La única manera de saber que usted tiene sífilis es hacerse la prueba.

4. ¿Cuándo debería hacerme la prueba?

Para hacerse la prueba de sífilis, vaya a un médico o una clínica de salud. Hay sitios de prueba confidenciales gratuitos o de bajo costo disponibles en todo el condado de Los Ángeles. Para encontrar pruebas y tratamiento gratuitos o de bajo costo, llame a la línea directa de ETS (800) 758-0880 o visite www.publichealth.lacounty.gov/dhsp/STDClinics.

Si está teniendo relaciones sexuales sin usar un condón y/o tiene múltiples parejas sexuales, hágase la prueba cada 6 meses. Si usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres, hágase la prueba cada 3 a 6 meses. Hágase la prueba si es mujer y planea quedar embarazada. Si está embarazada, recuérdelo a su médico que le haga la prueba tres veces: durante el primer trimestre (1 a 12 semanas), el tercer trimestre (28 a 32 semanas) y el parto.

5. ¿Cómo se trata la sífilis?

La sífilis se puede tratar y curar con antibióticos (medicamento que mata las bacterias). Asegúrese de que su(s) pareja(s) sexual(es) se hagan la prueba y reciban tratamiento también. Esto les ayudará a mantenerse saludables y evitará que propaguen la sífilis a otras personas o a usted (de nuevo).

6. ¿Cómo puedo prevenir la sífilis?

- Use un condón o barreras bucal cada vez que tenga sexo.
- Limite a sus parejas sexuales.
- Hágase la prueba regularmente.
- Si usted está embarazada, busque atención prenatal temprano para prevenir problemas de salud para usted y su bebé.

***Para obtener más información sobre la sífilis congénita entre los bebés, consulte las "Preguntas frecuentes sobre sífilis congénita".**



Puntos Clave

- La sífilis está en aumento en el condado de Los Ángeles.
- Los síntomas comunes de la sífilis incluyen una llaga o erupción, pero muchas personas no notan los síntomas.
- Hágase la prueba de sífilis.
- La sífilis es curable y prevenible.

Para más información:

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

www.publichealth.lacounty.gov/dhsp/

Departamento de Salud Pública de California

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Syphilis.aspx

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm