


同性恋男性/与男性性交的男性的脑膜炎（脑膜炎球菌病） 谁应该接受疫苗？

最近的洛杉矶县数据显示在同性恋男性/与男性性交的男性（MSM）中发生比平常更多的病例。本单张描述了此疾病，应该接受疫苗的人，以及可获得疫苗的所在地。



1. 什么是脑膜炎球菌病？

脑膜炎球菌病是种不常见，但是严重的疾病。它是由细菌（病菌）引起的。它可以导致严重的问题，像是：

- 脑膜炎（脑和脊髓肿胀）
- 耳聋
- 脑损伤
- 损失肢体（手臂或脚）
- 死亡

2. 脑膜炎球菌病的症状有哪些？

刚开始时会有似流感（似感冒）的症状，也可能造成下列状况：

- 高烧
- 颈僵硬
- 恶心
- 对光敏感
- 头痛
- 皮疹
- 呕吐
- 迷乱

3. 您可以如何预防脑膜炎球菌病？

这些健康的习惯可以帮助预防感染：

- 注射疫苗是预防此疾病的最佳方法
- 不共用会传染唾液的物品，如刀叉，食物，饮料或香烟
- 限制与生病的人有亲密的接触

4. 谁应该接受脑膜炎球菌疫苗？

洛杉矶县公共卫生部建议以下人士应接受脑膜炎球菌疫苗：

- 艾滋病毒呈阳性反应者
- 所有同性恋男性/MSM，无论他们的艾滋病毒状态或风险因子。

CDCP-IP-0006-10 (08/04/16)

5. 所列的同性恋男性/MSM 群体应该接受多少剂的疫苗？

谁应该接受疫苗？	剂量数目
从未接受 脑膜炎球菌疫苗的阳性艾滋病毒的同性恋男性/MSM	2 剂疫苗 (相隔 8 或更多周)
在儿童或青少年时期曾接受 1 剂 脑膜炎球菌疫苗的阳性艾滋病毒的同性恋男性/MSM	现在接受 1 剂疫苗
从未接受脑膜炎球菌疫苗的同性恋男性/MSM (无论 他们的艾滋病毒状态如何)	现在接受 1 剂疫苗
5 年或更多年以前曾接受 1 剂脑膜炎球菌疫苗的同性 恋男性/MSM (无论他们的艾滋病毒状态如何)	现在接受 1 剂疫苗

6. 您可以从何处获得脑膜炎球菌疫苗？

您可以从何处获得它？	更多信息
您的个人医生或保健提供者	<p>如果有下列情形，请去看您的常规医师…</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有健康保险 • 符合 HIV-positive Ryan White Program (阳性艾滋病毒 Ryan White 计划) 的个人 <p>我们建议健保计划为其会员提供脑膜炎球菌疫苗承保。</p>
药房	<p>有些药房提供脑膜炎球菌疫苗。 致电您的药房查看…</p> <ul style="list-style-type: none"> • 他们是否有该疫苗 • 他们的营业时间 • 谁可以获得该疫苗 • 费用多少 <p>可能提供疫苗接种的药房公布在 http://flushot.healthmap.org 上</p>
Los Angeles County Department of Health Services (DHS, 洛杉矶县 卫生服务部) 诊所	<p>没有健康保险的同性恋男性/MSM 可以造访任何 DHS 紧急护理中心(UCC); www.dhs.lacounty.gov 网站上提供了一份 UCC 地点和营业时间的清单, 或者也可以致电 211 取得该清单。个人将接受财务筛检, 可能根据收入而需分担费用。接受 DHS 常规护理的个人可以从他们的常规提供者处接受疫苗。</p>
Los Angeles County Department of Public Health (DPH, 洛杉矶县 公共卫生部) 诊所	<p>DPH 正举办提供免费疫苗看诊给有脑膜炎球菌病风险者。看诊日期, 时间和地点公布在 http://publichealth.lacounty.gov/ip/Docs/meningitisclinics.pdf 上</p>

7. 您可以通过哪些渠道获取更多信息？

疾病控制与预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention)
www.cdc.gov/meningitis/index.html

加州公共卫生部 (California Department of Public Health)
www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Pages/MeningococcalDisease.aspx

CDCP-IP-0006-10 (08/04/16)