

CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE-9 (PHQ-9)

Durante las <u>últimas 2 semanas</u> , ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas? (Marque con un "□" para indicar su respuesta)	Ningún día	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Poco interés o placer en hacer cosas	0	1	2	3
2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas	0	1	2	3
3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido demasiado	0	1	2	3
4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía	0	1	2	3
5. Sin apetito o ha comido en exceso	0	1	2	3
6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su familia	0	1	2	3
7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión	0	1	2	3
8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas podrían haberlo notado? o lo contrario – muy inquieto(a) o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de lo normal	0	1	2	3
9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de lastimarse de alguna manera	0	1	2	3

FOR OFFICE CODING 0 + + +

=Total Score:

Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?

No ha sido difícil

Un poco difícil

Muy difícil

Extremadamente difícil

PHQ-9* Questionnaire for Depression Scoring and Interpretation Guide

Scoring:

Count the number (#) of boxes checked in a column. Multiply that number by the value indicated below, then add the subtotal to produce a total score. The possible range is 0-27. Use the table below to interpret the PHQ-9 score.

Not at all (#) _____ x 0 = _____
Several days (#) _____ x 1 = _____
More than half the days (#) _____ x 2 = _____
Nearly every day (#) _____ x 3 = _____

Total score: _____

Interpreting PHQ-9 Scores

Diagnosis	Total Score	For Score	Action
Minimal depression	0-4	≤ 4	The score suggests the patient may not need depression treatment
Mild depression	5-9	5 - 14	Physician uses clinical judgment about treatment, based on patient's duration of symptoms and functional impairment
Moderate depression	10-14		
Moderately severe depression	15-19	> 14	Warrants treatment for depression, using antidepressant, psychotherapy and/or a combination of treatment.
Severe depression	20-27		